

UTILISATION DES RÉTINOÏDES EN MÉDECINE GÉNÉRALE DANS LE TRAITEMENT DE L'ACNÉ

Etat des lieux sur la pratique des médecins et assistants en médecine générale en région Wallonie-Bruxelles concernant l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné

Travail de fin d'études en vue de l'obtention du master complémentaire en médecine générale

Dr Jessalyn MARKHAM

Promoteur : Dr Virginie DERKENNE

Faculté de Médecine – Année académique 2023-2024

ANNEXES



TABLE DES ANNEXES

<u>ANNEXE 1</u> : GUIDE DE BONNE PRATIQUE SUR L'UTILISATION DES RÉTINOÏDES.....	2
<u>ANNEXE 2</u> : FLOW CHART DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE	3
<u>ANNEXE 3</u> : QUESTIONNAIRE TFE PUBLIÉ SUR GOOGLE FORM.....	4
<u>ANNEXE 4</u> : DÉCISION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE	11
<u>ANNEXE 5</u> : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS	18

UTILISATION DES RÉTINOÏDES EN MÉDECINE GÉNÉRALE

GUIDE DE BONNE PRATIQUE

N.B. Cette fiche concerne **uniquement** l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné en médecine générale et non les autres traitements.

Rétinoïdes LOCAUX (RL) utilisés en Belgique dans l'acné

Trétinoïne : Treclinax® (RL + dindamycine)

Adapalène : Differin® (RL seul) et Epiduo® (RL + benzoyle de peroxyde)

Trifarotène : Aklief® (RL seul)


Messages clés :

- Préférer les associations (benzoyle de peroxyde > antibiotiques locaux)
- Adapalène = meilleure tolérance

Rétinoïdes ORAUX (RO) utilisés en Belgique dans l'acné

ISOTRÉTINOÏNE : Roaccutane®, Isocural®, Isosupra®, Isotrétinoïne®

INDICATIONS




SUIVI DU PATIENT SOUS RÉTINOÏDES ORAUX

AVANT le traitement par RO	PENDANT le traitement par RO	APRÈS le traitement par RO
<p>Biologie sanguine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Transaminases, bilan lipidique (triglycérides) et beta-HCG (si ♀) <p>Mise en route ou maintien d'une contraception efficace (si ♀)</p>	<p>Biologie sanguine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beta-HCG 1x/mois ✓ Transaminases et triglycérides après 1 mois puis tous les 3 mois ✓ CPK : uniquement si symptômes musculaires <p>Maintien de la contraception (si ♀)</p> <p>Ordonnance couvrant MAX 30 jours</p>	<p>Biologie sanguine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beta-HCG 1 mois post traitement (si ♀) <p>Poursuivre la contraception pendant encore 1 mois (si ♀)</p> <p>Minimum 8 semaines entre deux cures si rechute</p>

EFFETS INDESIRABLES (EI) ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EI des Rétinoïdes LOCAUX (RL)	EI des Rétinoïdes ORAUX (RO)
<p>Irritation cutanée et sécheresse des muqueuses</p> <ul style="list-style-type: none"> → Crème hydratante, éviter d'appliquer sur la bouche, les narines et les yeux <p>Photosensibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> → Si région ensoleillée : application nocturne → Si forte exposition : arrêt du traitement <p>Risque tératogène possible mais non prouvé</p> <ul style="list-style-type: none"> → Arrêt du traitement si grossesse 	<p>Irritation cutanée et sécheresse des muqueuses</p> <ul style="list-style-type: none"> → Crème hydratante, larmes artificielles, lubrifiant vaginal, effet dose-dépendante (diminution de la dose si nécessaire après 1 semaine) ! <p>Photosensibilité</p> <ul style="list-style-type: none"> → Si région ensoleillée : crème solaire indice 50+ → Si forte exposition : arrêt du traitement. <p>Troubles du métabolisme hépatique et lipidique</p> <ul style="list-style-type: none"> → Surveillance par biologie sanguine : cf. ci-dessus → Réduire la dose si élévation X3 des transaminases <p>Tératogénicité ! Arrêt du traitement si grossesse !</p> <p>Troubles psychiatriques : non établis avec certitude</p> <p>Hyperostose, tendinite calcifiante, périostite et myalgies diffuses (cas de rhabdomyolyse décrit)</p>
<p>ISOTRETINOÏNE CHEZ LA FEMME</p> <p>Toute femme non ménopausée et en âge de procréer</p> <p>Contraception efficace avant, pendant et un mois après le traitement :</p> <p>Un moyen de contraception indépendant de l'utilisatrice (stérilet, implant)</p> <p>OU BIEN</p> <p>Deux moyens de contraception dépendants de l'utilisatrice (méthode barrière et pilule)</p> <p>Biologie sanguine avec beta HCG tous les mois avant, pendant et un mois après le traitement !</p> <p>Ordonnance couvrant maximum 30 jours de traitement</p> <p>Délivrance de l'ordonnance dans les 7 jours par la pharmacie</p> <p>Signatures des deux parents si la patiente a moins de 18 ans</p>	<p>CONTRE-INDICATIONS A L'ISOTRETINOÏNE</p> <p>Grossesse et allaitement !</p> <p>Prise d'autres dérivés de vitamine A (hypervitaminose A)</p> <p>Prise de tétracycline (risque de pseudotumeur cérébrale) : STOP 7 jours avant un traitement par une tétracycline</p> <p>Patients de moins de 12 ans</p> <p>Hyperlipidémie non traitée</p> <p>Don de sang</p> <p>Allergies aux arachides ou au soja</p> <p>Asthme : risque de bronchospasme</p>



Questionnaire TFE

Etat des lieux sur la pratique des médecins et assistants en médecine générale en région Wallonie-Bruxelles concernant l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné

Dans le cadre de mon TFE, je m'interroge sur la manière dont les médecins généralistes et les assistants en médecine générale utilisent les rétinoïdes dans le traitement de l'acné. Le questionnaire qui va suivre n'a pas pour but d'évaluer vos connaissances mais plutôt d'obtenir un aperçu de la pratique des médecins généralistes en région Wallonie Bruxelles. Il est donc important d'y répondre en toute honnêteté et sans effectuer de recherches au préalable sur le sujet. Ce questionnaire dure environ 10 minutes et il est totalement anonyme. Un des objectifs de ce travail vise également à la rédaction d'une fiche synthèse reprenant les points clés de la prescription de rétinoïdes (à savoir quand les débiter et comment les utiliser au mieux) dans le traitement de l'acné. Si vous désirez recevoir cette fiche, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail à la fin de ce questionnaire afin que je puisse vous la transmettre le moment venu. En remplissant ce questionnaire, vous marquez votre consentement explicite à participer. Cette participation se fait sur base volontaire, vous êtes libre d'interrompre votre participation à tout moment.

Avant de vous laisser découvrir le questionnaire, certains termes sont à clarifier :

- **Rétinoïdes locaux utilisés dans l'acné** : trétinoïne (nom des spécialités belges en contenant : Treclinax®), adapalène (nom des spécialités belges en contenant : Differin®, Epiduo®), trifarotène (nom des spécialités belges en contenant : Aklied®).
- **Rétinoïdes oraux utilisés dans l'acné** : principalement l'isotrétinoïne (noms des spécialités belges en contenant : Roaccutane®, Isocural®, Isosupra®). Les autres rétinoïdes étant utilisés dans le traitement du psoriasis, de l'eczéma et du lymphome, nous n'en parlerons pas.

I. PARTIE I – SOCIO DEMOGRAPHIQUE

1. Êtes-vous ? *

- Une femme
- Un homme

2. Quel âge avez-vous ? *

- Entre 25 et 35 ans
- Entre 36 et 45 ans
- Entre 46 et 55 ans
- Entre 56 et 65 ans
- Plus de 65 ans

3. Dans quelle province wallonne de Belgique pratiquez-vous la médecine ? *

- Brabant-Wallon
- Hainaut
- Liège
- Namur
- Luxembourg
- Région Bruxelles – Capitale

4. Dans quel milieu pratiquez-vous ? *

- Rural
- Urbain

5. Quelle est votre type de pratique ? *

- Pratique solo
- Association de médecins
- Maison médicale (pluridisciplinaire)
- Cabinet médical

6. Depuis combien de temps exercez-vous la médecine ? *

- Moins de 5 ans
- Entre 5 et 10 ans
- Entre 10 et 15 ans
- Entre 15 et 20 ans
- Plus de 20 ans

7. Durant votre parcours médical, avez-vous suivi des stages en dermatologie ou des formations spécifiques en dermatologie ? *

- Oui
- Non

II. PARTIE II – EN PRATIQUE

Rétinoïdes locaux :

- 8. Considérez-vous que prescrire des rétinoïdes locaux comme traitement de l'acné fasse partie des rôles du médecin généraliste ? ***
- Oui
 - Non
 - Oui mais uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par le dermatologue
- 9. Vous sentez-vous à l'aise avec la prescription de rétinoïdes locaux ? ***
- Oui
 - Non
- 10. A quelle fréquence prescrivez-vous des rétinoïdes locaux ? ***
- Plusieurs fois par mois
 - Une fois par mois
 - Une fois par trimestre
 - Une fois par semestre
 - Une fois par an
 - Jamais
- 11. Avez-vous déjà débuté un traitement par rétinoïdes locaux sans avis dermatologique au préalable ? ***
- Oui
 - Non
- 12. Dans quelles indications prescrivez-vous des rétinoïdes locaux ? Plusieurs réponses possibles. ***
- Acné légère
 - Acné modérée
 - Acné sévère
 - Acné grave et rebelle
 - Jamais

13. Informez-vous systématiquement vos patients des effets secondaires associés à la prise de rétinoïdes locaux avant de leur en prescrire ? *

- Oui
- Non

Rétinoïdes oraux :

14. Considérez-vous que la prescription de rétinoïdes oraux comme traitement de l'acné fasse partie des rôles du médecin généraliste ? *

- Oui toujours
- Non
- Oui mais uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par le dermatologue

15. Vous sentez-vous à l'aise avec la prescription de rétinoïdes locaux ? *

- Oui
- Non

16. A quelle fréquence prescrivez-vous des rétinoïdes oraux ? *

- Plusieurs fois par mois
- Une fois par mois
- Une fois par trimestre
- Une fois par semestre
- Une fois par an
- Jamais

17. Avez-vous déjà débuté un traitement par rétinoïde oral sans avis dermatologique au préalable ? *

- Oui
- Non

18. Dans quelles indications prescrivez-vous des rétinoïdes locaux ? Plusieurs réponses possibles. *

- Acné légère
- Acné modérée
- Acné sévère

- Acné grave et rebelle
- Jamais

19. Informez-vous systématiquement vos patients des risques et des effets secondaires associés à la prise de rétinoïdes oraux avant de leur en prescrire ? *

- Oui
- Non
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

20. Est-ce que le sexe de votre patient conditionne votre décision à prescrire ou non un rétinoïde par voie orale ? *

- Oui
- Non
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

21. Lorsque vous prescrivez un rétinoïde oral, quelle durée couvre l'ordonnance ? *

- 15 jours
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

22. Dans le cadre du suivi d'un traitement par rétinoïdes oraux, à quelle fréquence réalisez-vous une prise de sang (surveillance des transaminases et Beta HCG) ? *

- Tous les 15 jours
- Tous les mois
- Tous les 3 mois
- Tous les 6 mois
- Jamais
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

23. Quel type de contraception imposez-vous à vos patientes en âge de procréer qui reçoivent un traitement par rétinoïdes oraux ? Plusieurs réponses possibles. *

- Aucune
- Implant
- Stérilet
- Préservatifs

- Pilule
- Pilule + préservatif
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

24. Après un traitement par rétinoïdes oraux, pendant combien de temps assurez-vous la surveillance par contraception et dosage du Beta HCG ? *

- 15 jours
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
- Jamais
- Non pertinent, je n'en prescris jamais

25. Utilisez-vous des fiches informatives ou des outils de prévention à destination des patients concernant l'utilisation des rétinoïdes oraux (prospectus, affiches de salle d'attente, site internet ...) ? *

- Oui
- Non

26. Toutes les propositions ci-dessous concernant l'utilisation des rétinoïdes oraux sont correctes. Veuillez sélectionner celles dont vous n'avez pas connaissance jusqu'à aujourd'hui : *

- Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne.
- L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.
- Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement.
- Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses.
- La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.

27. Avez-vous déjà été confronté à une grossesse sous rétinoïdes oraux ? *

- Non
- Oui et je l'ai déclarée aux autorités de pharmaco surveillance

- Oui et je ne l'ai pas déclarée aux autorités de pharmaco surveillance

III. PARTIE III – ATTENTES ET POINTS A AMELIORER

28. Pensez-vous que les médecins généralistes soient suffisamment informés sur la question des rétinoïdes ? *

- Oui
- Non

29. Si vous souhaitez recevoir la fiche synthèse reprenant les points clés de l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné en médecine générale, veuillez laisser votre adresse mail ci-dessous :

- Réponse libre

30. Avez-vous des questions, des suggestions à apporter sur ce sujet ?

- Réponse libre

*Réponse obligatoire

PDF du formulaire GEIMG.

Le but de la démarche est de permettre d'identifier s'il est nécessaire ou pas de soumettre, avant la rédaction du TFE, un dossier à un des trois comités d'éthique universitaires :

- le comité d'éthique hospitalo-facultaire universitaire de Liège
- le comité d'éthique hospitalo-facultaire UCLouvain
- le comité d'éthique hospitalo-facultaire Erasme – ULB

Chercheur

Docteur MARKHAM Jessalyn.

Email : jessalyn.markham@student.uclouvain.be

Gsm : 0032471081739

Candidat en master de spécialisation en MG à l'UCL.

Tuteur

Docteur Derkenne Virginie .

Email : vderkenne@yahoo.fr

Gsm : 0475686129

TFE en Médecine générale

Travail de fin d'étude dans le cadre d'un master de spécialisation en médecine générale.

Quel sera le titre prévu pour votre TFE ?

Utilisation des rétinoïdes en médecine générale dans le traitement de l'acné

Discipline dont relève l'étude

Médecine générale. Etude universitaire non commerciale.

Objectif du TFE (question de recherche)

Etat des lieux sur la pratique des médecins et assistants en médecine générale en région Wallonie Bruxelles concernant l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné

Année académique de présentation du TFE

2023-2024.

Description du TFE

Il s'agira d'une recherche QUANTITATIVE, observationnelle et transversale. Son but est descriptif. L'utilisation d'un questionnaire en ligne me permettra d'avoir un échantillon plus grand dans un temps court (celui de notre TFE). Le questionnaire sera divisé en plusieurs parties : la première partie comprenant les questions socio-démographiques, la deuxième partie reprenant les questions sur la manière de pratiquer des médecins généralistes (cette partie sera elle-même divisée en deux sous parties : une concernant les rétinoïdes locaux et l'autre concernant les rétinoïdes oraux) et enfin une troisième partie reprenant les questions liées aux attentes des médecins et sondant les points à améliorer dans le domaine. Enfin, j'aimerais proposer aux médecins une fiche synthèse reprenant les

points clés de l'utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné en médecine générale sur base des guidelines.

Résumez succinctement votre TFE (maximum 250 signes)

Sondage auprès des médecins et assistants en médecine générale sur leur utilisation des rétinoïdes dans le traitement de l'acné en corrélation à ce qui est retrouvé dans la littérature (Guidelines).

Quels sont les objectifs de votre recherche (minimum 1500 signes) ?

A quel point les médecins généralistes se sentent ils confortables avec l'utilisation et la prescription des rétinoïdes ? Considèrent ils que la prescription de rétinoïdes oraux comme traitement de l'acné sévère fait partie du rôle des médecins de première ligne ? Peuvent ils initier un traitement par rétinoïdes oraux sans avis dermatologique au préalable ? Mettent ils correctement en place le suivi mensuel par prise de sang et contraception hormonale ? Est-ce que le sexe du jeune patient conditionne leur décision d'instaurer ou non un traitement par rétinoïdes ? L'objectif de mon TFE est de pouvoir éclairer ces différentes interrogations.

- Savoir si la première ligne de soins maîtrise la prescription de rétinoïdes mais également si elle est sensibilisée à l'importance du suivi afin de soigner les patients en toute sécurité tout en soulageant la seconde ligne de soins (dermatologues).
- Interroger la littérature et les guides de bonne pratique sur le sujet afin d'émettre une comparaison avec les pratiques des médecins généraliste en région Wallonie Bruxelles.
- Pouvoir comparer les différentes pratiques en terme d'utilisation des rétinoïdes en fonction de l'âge du praticien, de son sexe, de sa province, de son milieu de pratique (rural, urbain, ...) ou encore de ses années d'expérience.
- Amener les médecins généralistes à réfléchir à leur pratique et à la confronter à ce qui est publié dans la littérature.
- Proposer une fiche mnémotechnique reprenant les points clés de la prescription de rétinoïdes pour les médecins qui le souhaitent.

Avez-vous d'autres informations utiles à apporter pour permettre aux membres du GEIMG de comprendre votre travail ?

Non je n'en ai pas.

Domaines exclusifs du TFE

S'agit-il UNIQUEMENT de questionnaires adressés à des professionnels de santé sur leur pratique professionnelle, SANS CARACTERE DELICAT comme, par exemple, des antécédents de burnout, conflits professionnels graves, assuétudes, ...) ?

Oui

S'agit-il EXCLUSIVEMENT d'une enquête sur l'organisation matérielle de soins (organisation d'un cabinet ou de maisons de repos, trajets de soins, gestion de stocks, gestion de flux de patients, comptabilisation de journée d'hospitalisation, coût de soins, ...) ?

Non

S'agit-il EXCLUSIVEMENT d'enquêtes auprès de personnes non sélectionnées (enquêtes de rue, enquête sur les réseaux sociaux, ...), par exemple, sur les habitudes sportives, alimentaires, etc., sans caractère intrusif ?

Non

S'agit-il **UNIQUEMENT** d'une revue bibliographique ?

Non

Description de la méthodologie utilisée pour le TFE

Quelle méthodologie sera utilisée pour le TFE ?

une recherche quantitative

Dans le cas d'une recherche littérature,

- **Quels mots clés seront utilisés ?**
Sans objet
- **Dans quels types de littérature ?**
Sans objet
- **Quels critères d'inclusion/d'exclusion ?**
Sans objet
- **Quelle période (x dernières années) ?**
Sans objet
- **Full-text/abstract, ... ?**
Sans objet
- **Autres précisions ?**
Sans objet

Dans le cas d'une recherche qualitative,

- **Quel public cible ?**
Sans objet
- **Quels outils seront utilisés (enquête, focus group, interviews, entretiens semi-dirigés) ?**
Sans objet
- **Quel type d'analyse sera mise en œuvre (théorisation ancrée, analyse thématique, ...) ?**
Sans objet
- **Quels moyens d'enregistrement et d'anonymisation seront utilisés ?**
Sans objet

Dans le cas d'une recherche quantitative,

- **Quel public cible ?**
Médecins généralistes en activité ou assistants en médecine générale, peu importe le type de pratique (urbaine, rurale, semi-rurale), leur âge et leur sexe.
Exerçant en région Wallonie Bruxelles.
- **Quelle est la méthode de recrutement ?**
Le questionnaire sera distribué dans les différentes boites mails des médecins généralistes et assistants en médecine générale de la région Wallonie Bruxelles.

Si cela s'avère insuffisant, j'envisagerais de véhiculer le lien vers le questionnaire via les réseaux sociaux (notamment sur les différents groupes médicaux).

- **Quel est le type d'échantillonnage ?**
Echantillonnage représentatif. Minimum 100 participants avec si possible moins de 30% d'assistants. Idéalement, d'après le calcul d'échantillonnage, il me faudrait 350 participants. Population étudiée approximative : 10 000 médecins. La marge d'erreur est de 5% avec un intervalle de confiance de 95%.
- **Quelles sont les procédures d'analyse ?**
Analyse descriptive des résultats obtenus. Je diviserai l'échantillon en différents bras (âge du médecin, années de pratique, type de pratique, lieux de pratique). A l'aide d'une méthode statistique encore à déterminer (probablement le T de Student) je chercherai s'il existe des différences significatives entre la manière de pratiquer et la catégorie dans laquelle se situe le médecin. Je comparerai également les manières de pratiquer avec la littérature (Guidelines).
- **Quelle est la procédure d'anonymisation ?**
Le questionnaire en ligne sera totalement anonyme ! Les seules informations personnelles demandées seront : le sexe, l'âge, le lieu et le type de pratique. Le nom, le prénom et la date de naissance du médecin répondant ne seront pas demandés ! Si et seulement si les participants le désirent, ils pourront laisser leur adresse mail afin de recevoir à la fin de l'étude la fiche mnémotechnique réalisée dans le cadre de ce TFE et qui reprendra les points clés de la prescription de rétinoïdes dans l'acné.

S'il s'agit d'un travail assurance qualité,

- **Quel public cible ?**
Sans objet
- **Décrivez le type de travail assurance qualité**
Sans objet

S'il s'agit d'une recherche-action,

- **Quel public cible ?**
Sans objet
- **Décrivez le type de recherche-action**
Sans objet

S'il s'agit d'une autre méthodologie,

- **Quel public cible ?**
Sans objet
- **Décrivez cette autre méthodologie**
Sans objet

S'agit-il d'une recherche clinique interventionnelle (PICO) ?

Non

- **Quelle est la population cible ?**
Sans objet

- **Quels sont les critères d'inclusion/exclusion ?**
Sans objet
- **Quelle est l'intervention ?**
Sans objet
- **Quel est le comparateur ?**
Sans objet
- **Autres précisions ?**
Sans objet

Étude sur un médicament

L'étude porte-t-elle sur l'expérimentation d'un médicament ou encore des changements de doses, des changements d'heure de prise, une dé-prescription, ... ?

Non

Si OUI, compte tenu des données disponibles actuellement, estimez-vous que l'expérimentation est de nature à entraîner un risque ?

Sans objet

Si OUI, décrivez le risque de l'expérimentation :

Sans objet

Si NON, justifiez en quoi l'expérimentation n'entraîne pas de risque :

Sans objet

Étude sur un dispositif médical

L'étude porte-t-elle sur un dispositif médical ?

Non

Si OUI, expliquez comment le dispositif est utilisé dans l'indication du fabricant ?

Sans objet

Recherche auprès de personnes

Allez-vous mener une étude auprès de personnes ?

Non

Si OUI, quel en est le (les) public(s) cible(s) ?

Sans objet

Si OUI, quelle(s) type(s) de méthodologie allez-vous utiliser pour cette recherche auprès de personnes ?

Sans objet

Si OUI, avez-vous prévu un document de consentement éclairé pour les personnes participantes ?

Sans objet

Si OUI, la confidentialité et l'anonymisation des données de l'étude seront-elles mentionnées et assurées ?

Sans objet

Si OUI, décrivez comment vous allez garantir la protection de la vie privée des participants à l'étude ? Précisez les mesures prises.

Sans objet

Si OUI, quelle sera la date de début de l'étude prévue auprès des personnes ?

Sans objet

Si OUI, quelle sera la date de fin de l'étude prévue auprès des personnes ?

Sans objet

Questions spécifiques

L'étude est-elle destinée à être publiée dans une revue (hors www.mgtfe.be) ?

Non

L'étude est-elle interventionnelle chez des patients ? Allez-vous tester l'effet d'une modification de prise en charge ou de traitement dans le futur ?

Non

L'étude comporte-t-elle une enquête sur des aspects délicats de la vie privée, quelles que soient les personnes interviewées (sexualité, maladie mentale, maladies génétiques, etc....) ?

Non

L'étude comporte-t-elle des interviews d'enfants mineurs d'âge ?

Non

Si OUI, avez-vous prévu un document de consentement éclairé pour les parents ou les tuteurs des mineurs concernés ?

Sans objet

Y-a-t-il enquête sur la qualité de vie ou la compliance au traitement de patients traités pour une pathologie spécifique ?

Non

Y-a-t-il enquête auprès de patients fragiles (malades ayant des troubles cognitifs, malades en phase terminale, ...) ?

Non

Responsabilités et engagements

Je confirme que les informations fournies dans ce document sont correctes.

Je pense que cette étude pourra être menée dans le respect du protocole et des principes de la "Déclaration d'Helsinki", des "Bonnes Pratiques Cliniques" et de la législation belge relative à la protection de la vie privée des patients et des participants et aux expérimentations sur embryon/sur la personne humaine/sur le matériel corps humain.

Je m'engage à exercer mes responsabilités de chercheur principal pour cette étude. L'investigateur porte toute la responsabilité administrative et pratique de l'organisation locale d'un projet de recherche clinique. Cette responsabilité est à la fois médicale (paramédicale) et légale. Elle s'exerce vis-à-vis du tuteur, de l'institution, du participant et du Comité d'Éthique.

J'ai pris les mesures requises pour assurer la protection des participants que je recruterai pour cette étude. Ceci signifie notamment :

- qu'aucune donnée d'identification ne sera accessible à des tiers.
- qu'aucune association de données pouvant permettre la ré-identification des participants ne sera accessible à des tiers.
- que les fichiers informatiques, les documents papiers, les documents audio, les documents vidéo contenant les données récoltées seront protégés des utilisations abusives.

Décision du GEIMG finalisée électroniquement le 01/12/2023

ULiège (Vanmeerbeek Marc) : A = Accord pour non soumission à un comité d'éthique.

UCL (LETOCART Véronique) : A = Accord pour non soumission à un comité d'éthique.

ULB (Vanderhofstadt Quentin) : A = Accord pour non soumission à un comité d'éthique.

Suivi à donner à la décision du GEIMG

Comme les avis correspondent à 3 « A », le GEIMG décide que le projet de TFE ne nécessite pas de soumettre un dossier plus spécifique au comité d'éthique de l'université concernée.

« Nous vous invitons à joindre cette décision du GEIMG en annexe de votre TFE. Vous pourrez ainsi attester de votre démarche éthique auprès du jury interuniversitaire »

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

N	Sexe	Age	Province de pratique	Milieu de pratique	Type de pratique	Année d'expérience	Avez-vous eu une formation en dermatologie au préalable ?	Considérez-vous que prescrire des rétinoïdes locaux comme traitement de l'acné fasse partie des rôles du médecin généraliste ?	Vous sentez-vous à l'aise avec la prescription de rétinoïdes locaux ?	A quelle fréquence prescrivez vous des rétinoïdes locaux ?	Avez-vous déjà débuté un traitement par rétinoïdes locaux sans avis dermatologique au préalable ?	Dans quelles indications prescrivez vous des rétinoïdes locaux ? Plusieurs réponses possibles.	Informez vous systématiquement vos patients des effets secondaires associés à la prise de rétinoïdes locaux avant de leur en prescrire ?	Considérez vous que la prescription de rétinoïdes oraux comme traitement de l'acné fasse partie des rôles du médecin généraliste ?	Vous sentez vous à l'aise avec la prescription de rétinoïdes oraux ?	A quelle fréquence prescrivez vous des rétinoïdes oraux ?
1	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre
2	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Non	Acné modérée	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre
3	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par le dermatologue	Non	Jamais	Non	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
4	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par an
5	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
6	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par le dermatologue	Non	Une fois par semestre
7	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
8	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
9	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
10	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
11	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Rural	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par an	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par an
12	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois
13	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non	Oui	Non	Une fois par semestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

14	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Entre 10 et 15 ans	Oui	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
15	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Liège	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Non	Plusieurs fois par mois
16	Une femme	Plus de 65 ans	Hainaut	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par an	Non	Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an
17	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Jamais
18	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
19	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
20	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Cabinet médical	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Jamais	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Oui	Jamais
21	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné légère, Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an
22	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
23	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
24	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Liège	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
25	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par an	Oui	Acné légère	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
26	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par trimestre	Non	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par trimestre
27	Une femme	Plus de 65 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
28	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Brabant-Wallon	Rural	Cabinet médical	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

29	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
30	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Namur	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère	Oui	Oui	Non	Une fois par semestre
31	Un homme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné légère, Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois
32	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Liège	Rural	Association de médecins	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
33	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Urbain	Association de médecins	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par trimestre
34	Un homme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Oui	Non	Non	Jamais
35	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
36	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Liège	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Oui	Une fois par trimestre
37	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
38	Un homme	Plus de 65 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
39	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Namur	Rural	Pratique Solo	Entre 15 et 20 ans	Oui	Oui	Oui	Jamais	Non	Jamais	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
40	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Cabinet médical	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par semestre
41	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné modérée	Oui	Non	Non	Jamais
42	Un homme	Plus de 65 ans	Liège	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par trimestre
43	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Brabant-Wallon	Rural	Cabinet médical	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

44	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Brabant-Wallon	Rural	Association de médecins	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
45	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
46	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
47	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Liège	Rural	Pratique Solo maison médicale	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
48	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	(pluridisciplinaire)	Entre 15 et 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
49	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
50	Un homme	Plus de 65 ans	Brabant-Wallon	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
51	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
52	Une femme	Plus de 65 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
53	Une femme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
54	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
55	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire) Maison médicale	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par an
56	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	(pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par semestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Non	Jamais
57	Une femme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par trimestre
58	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Non	Une fois par an
59	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Namur	Rural	Pratique Solo	Entre 15 et 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

60	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Namur	Rural	Pratique Solo	Entre 15 et 20 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par an	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
61	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Liège	Rural	Association de médecins Maison médicale (pluridisciplinaire)	Entre 10 et 15 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an
62	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
63	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Urbain	Pratique Solo Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Non	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
64	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Hainaut	Urbain	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre
65	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Urbain	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée	Non	Oui	Oui	Une fois par mois
66	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
67	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
68	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Non	Jamais
69	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par trimestre
70	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
71	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Rural	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par mois
72	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Namur	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par trimestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

73	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
74	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Urbain	Association de médecins Pratique	Plus de 20 ans	Non	Non	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non	Jamais
75	Un homme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Non	Non	Une fois par semestre
76	Une femme	Plus de 65 ans	Namur	Urbain	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
77	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an
78	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Non	Une fois par an
79	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
80	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
81	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
82	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par an	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
83	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
84	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
85	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Non	Non	Jamais
86	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
87	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Luxembourg	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Oui	Une fois par trimestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

88	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Non	Une fois par an
89	Un homme	Plus de 65 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Non	Une fois par semestre	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par semestre
90	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Non	Non	Jamais
91	Un homme	Plus de 65 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par semestre	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
92	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Acné sévère	Oui	Oui	Non	Une fois par an
93	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an
94	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
95	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Cabinet médical	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Acné légère, Acné modérée	Oui	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Oui
96	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Non	Non	Jamais
97	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
98	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
99	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par an
100	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Luxembourg	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
101	Un homme	Entre 36 et 45 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
102	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

103	Une femme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné modérée	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par an
104	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Cabinet médical	Moins de 5 ans	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
105	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par trimestre
106	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins maison médicale	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Non	Jamais	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	Non	Jamais
107	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné légère, Acné modérée	Non	Oui	Non	Une fois par semestre
108	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Liège	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
109	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins maison médicale	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
110	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Maison médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Non	Une fois par an
111	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Acné grave et rebelle, Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non	Jamais
112	Un homme	Plus de 65 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois
113	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre	Non	Jamais	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
114	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

115	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
116	Un homme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Plus de 20 ans	Non	Oui	Non	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Non	Non	Jamais
117	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
118	Une femme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné légère	Oui	Non	Non	Une fois par trimestre
119	Un homme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
120	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
121	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Urbain	Cabinet médical	Moins de 5 ans	Non	Oui	Non	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée	Non	Non	Non	Jamais
122	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
123	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné modérée	Non	Oui	Oui	Une fois par an
124	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo maison	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
125	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	médicale (pluridisciplinaire)	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
126	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois
127	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
128	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Moins de 5 ans	Oui	Oui	Non	Une fois par an	Non	Acné légère, Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
129	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Cabinet médical	Entre 5 et 10 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre
130	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Luxembourg	Rural	Association de médecins Maison	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Jamais	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non	Une fois par trimestre
131	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Brabant-Wallon	Rural	médicale (pluridisciplinaire)	Entre 10 et 15 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
132	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Namur	Rural	Association de médecins	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée	Oui	Oui	Oui	Une fois par an

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

133	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Plusieurs fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
134	Une femme	Entre 46 et 55 ans	Liège	Urbain	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
135	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par trimestre	Non	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais
136	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
137	Un homme	Plus de 65 ans	Liège	Urbain	Association de médecins	Plus de 20 ans	Oui	Oui	Oui	Une fois par an	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	Non	Jamais
138	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Jamais	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non	Jamais
139	Un homme	Plus de 65 ans	Liège	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre	Non	Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par semestre
140	Un homme	Plus de 65 ans	Hainaut	Urbain	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Oui	Une fois par an	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par an
141	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Pratique Solo	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par mois
142	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Entre 15 et 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par trimestre
143	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Région Bruxelles Capitale	Urbain	Association de médecins	Moins de 5 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné légère, Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	Oui	Une fois par semestre
144	Une femme	Entre 36 et 45 ans	Liège	Urbain	Association de médecins	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par mois	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Non	Oui	Oui	Une fois par semestre

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

145	Un homme	Entre 56 et 65 ans	Hainaut	Rural	Pratique Solo	Plus de 20 ans	Non	Oui	Oui	Une fois par trimestre	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Oui	Une fois par trimestre
146	Une femme	Entre 25 et 35 ans	Brabant-Wallon	Urbain	Pratique Solo	Entre 5 et 10 ans	Non	Oui	Non	Une fois par an	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui, uniquement pour des renouvellements d'ordonnances réalisées au préalable par un dermatologue	Non	Une fois par an

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

Avez-vous déjà débuté un traitement par rétinoïdes oraux sans avis dermatologique au préalable ?	Dans quelles indications prescrivez vous des rétinoïdes oraux ?	Informez vous systématiquement vos patients des risques et des effets secondaires associés à la prise de rétinoïdes oraux avant de leur en prescrire ?	Est-ce que le sexe de votre patient conditionne votre décision à prescrire ou non un rétinoïde par voie orale ?	Lorsque vous prescrivez un rétinoïde oral, quelle durée couvre l'ordonnance ?	Dans le cadre du suivi d'un traitement par rétinoïdes oraux, à quelle fréquence réalisez vous une prise de sang (surveillance des transaminases et Beta HCG) ?	Quel type de contraception imposez vous à vos patientes en âge de procréer qui reçoivent un traitement par rétinoïdes oraux ? Plusieurs réponses possibles.	Après un traitement par rétinoïdes oraux, pendant combien de temps assurez vous la surveillance par contraception et dosage du Beta HCG ?	Utilisez vous des fiches informatives ou des outils de prévention à destination des patients concernant l'utilisation des rétinoïdes oraux (prospectus, affiches de salle d'attente, site internet ...) ?	Toutes les propositions ci-dessous concernant l'utilisation des rétinoïdes oraux sont correctes. Veuillez sélectionner celles dont vous n'avez pas connaissance jusqu'à aujourd'hui :	Avez-vous déjà été confronté à une grossesse sous rétinoïdes oraux ?	Pensez-vous que les médecins généralistes soient suffisamment informés sur la question des rétinoïdes ?
1 Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squeletiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
2 Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squeletiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

3	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
4	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	Non pertinent car je n'en prescris jamais	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
5	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule	Jamais	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
6	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	Non pertinent car je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Pilule + Préservatifs	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

7	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinénoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non
8	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinénoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinénoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
9	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les 3 mois	Non pertinent, je n'en prescris jamais	3 mois	Non	Associer un rétinénoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinénoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinénoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinénoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

10	Oui	Acné sévère	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
11	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
12	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Implant, Préservatifs, Pilule	1 mois	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

13	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinol oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinol oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
14	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinol oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
15	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	3 mois	Jamais	Aucune, Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinol oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinol oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
16	Non	Jamais	Oui	Oui	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Tous les 6 mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

17	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
18	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
19	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
20	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

21	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	1 mois	Jamais	Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
22	Oui	Acné légère, Acné modérée, Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Stérilet	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne.	Non	Oui
23	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
24	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

25	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
26	Non	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les 6 mois	Pilule	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
27	Oui	Acné légère, Acné modérée	Oui	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les mois	Pilule	3 mois	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

28	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
29	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
30	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 an	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non
31	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	3 mois	Oui	La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
32	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

										Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses.	Non	Oui
33	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non			
										Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
34	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non			
										Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
35	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Non			

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

36	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Aucune	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
37	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
38	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Stérilet, Préservatifs, Pilule	1 mois	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

39	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
40	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non
41	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
42	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule	1 an	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

43	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
44	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
45	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
46	Oui	Acné sévère	Non	Oui	1 mois	Tous les 6 mois	Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	6 mois	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

47	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	6 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	1 an	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
48	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
49	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
50	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

51	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses.	Non	Oui
52	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Stérilet, Pilule	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
53	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	15 jours	Tous les mois	Implant	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
54	Oui	Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

58	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
59	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement.	Non	Non
60	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

61	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 6 mois	Implant, Stérilet, Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
62	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
63	Oui	Acné sévère	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Oui et je l'ai déclarée aux autorités de pharmaco surveillance	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

64	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Stérilet, Préservatifs	3 mois	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
65	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
66	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
67	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

68	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	3 mois	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Oui et je ne l'ai pas déclarée aux autorités de pharmaco surveillance	Non
69	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
70	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les 3 mois	Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
71	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

72	Oui	Acné sévère	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
73	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
74	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule	6 mois	Non	Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses.	Non	Non
75	Non	Acné sévère	Oui	Oui	3 mois	Tous les 6 mois	Pilule	1 an	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

76	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	6 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
77	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule + Préservatifs	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
78	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Stérilet, Pilule	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

79	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
80	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
81	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Aucune	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

85	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L' isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculosquelettiques diffuses., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
86	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	6 mois	Tous les 3 mois	Stérilet, Préservatifs, Pilule	Jamais	Non	L' isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
87	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Non	La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

88	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Aucune, Implant, Stérilet, Pîlule	1 mois	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
89	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pîlule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
90	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

91	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
92	Non	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
93	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

94	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Tous les 3 mois	Implant, Pilule	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
95	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
96	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
97	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	3 mois	Non	Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

98	Oui	Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
99	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
100	Oui	Acné modérée, Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Oui
101	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

102	Oui	Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
103	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les 6 mois	Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
104	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

105	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
106	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

107	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
108	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Préservatifs	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
109	Non	Acné sévère, Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

110	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pâilule	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
111	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescriis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu' à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
112	Oui	Acné sévère	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pâilule	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d' une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

113	Non	Jamais	Oui	Non	6 mois	Tous les 3 mois	Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculoso squelettiques diffuses.	Non	Non
114	Oui	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculoso squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
115	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescrais jamais	Non pertinent, je n'en prescrais jamais	Non pertinent, je n'en prescrais jamais	Tous les mois	Non pertinent, je n'en prescrais jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

116	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelles	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
117	Oui	Acné grave et rebelles	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Aucune	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
118	Non	Acné sévère	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
119	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelles	Oui	Oui	15 jours	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

120	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
121	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescrist jamais	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
122	Oui	Acné modérée	Oui	Non	3 mois	Jamais	Aucune	Jamais	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

123	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
124	Oui	Acné sévère	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires diffuses.	Non	Oui
125	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
126	Oui	Acné modérée, Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

127	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
128	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle, Jamais	Oui	Oui	3 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Pilule	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
129	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Aucune	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

130	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule	Jamais	Oui	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
131	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Tous les 3 mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
132	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Non	1 mois	Tous les mois	Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Oui	Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
133	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Aucune, Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

134	Oui	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Préservatifs, Pilule, Pilule + Préservatifs	1 an	Oui	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
135	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Oui	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Stérilet, Pilule + Préservatifs	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
136	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	3 mois	Jamais	Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
137	Non	Acné grave et rebelle	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non	Non pertinent, je n'en prescris jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Pilule	1 an	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculaires squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

138	Non	Jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
139	Oui	Acné sévère	Oui	Non	3 mois	Tous les mois	Pilule	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
140	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 6 mois	Non pertinent, je n'en prescis jamais	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

141	Non	Jamais	Oui	Non	1 mois	Tous les 3 mois	Aucune, Implant, Stérilet, Préservatifs, Pilule	Jamais	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui
142	Non	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Non	6 mois	Tous les 3 mois	Implant, Pilule + Préservatifs	Non pertinent, je n'ai jamais eu de patient dans cette situation	Non	Associer un rétinoïde oral avec une tétracycline augmente le risque d'hypertension intracrânienne bénigne., L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
143	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Implant, Stérilet, Pilule + Préservatifs	6 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Le don de sang est interdit durant toute la durée du traitement par rétinoïdes oraux et jusqu'à un mois après l'arrêt du traitement., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
144	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	1 mois	Tous les mois	Pilule, Pilule + Préservatifs	1 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., Parmi les effets indésirables des rétinoïdes oraux nous retrouvons le bronchospasme et les douleurs musculo squelettiques diffuses., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui

ANNEXE 5 : TABLEAU DES RÉSULTATS INDIVIDUELS

145	Oui	Acné sévère, Acné grave et rebelle	Oui	Oui	3 mois	Tous les 3 mois	Aucune	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Non
146	Non	Acné grave et rebelle	Oui	Non pertinent, je n'en prescris jamais	1 mois	Tous les mois	Pilule + Préservatifs	3 mois	Non	L'isotrétinoïne ne peut pas être utilisée chez les personnes allergiques aux arachides., La délivrance d'une ordonnance de rétinoïde oral par le pharmacien doit être effectuée au plus tard 7 jours après la date de la prescription.	Non	Oui